

¡No se olvide de hacer un seguimiento!

Es importante que asista a las citas con el endocrinólogo pediátrico de su hijo mientras esté recibiendo tratamiento para la pubertad precoz central, o CPP. El médico de su hijo realizará exámenes y análisis de sangre periódicos en busca de señales de pubertad.

Para ayudarlo a mantenerse al día, complete sus próximas citas a continuación:

Fecha: _____ Hora: _____ Teléfono del Consultorio: _____

Fecha: _____ Hora: _____

Fecha: _____ Hora: _____

¿QUÉ ES SUPPRELIN® LA?

- SUPPRELIN® LA es un medicamento implantado de hormona liberadora de gonadotropina (GnRH) utilizada para el tratamiento de la pubertad precoz central (CPP).
- Se desconoce si SUPPRELIN® LA es seguro y eficaz en menores de 2 años de edad.

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional en la siguiente página.

Haga [clic aquí](#) para obtener la Información para Prescripción completa, incluida la Guía del Medicamento.

SUPPRELIN® LA
(histrelin acetate) subcutaneous implant

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD SOBRE SUPPRELIN® LA

- SUPPRELIN® LA no debe tomarse si su hijo es alérgico a la hormona liberadora de gonadotropina (GnRH), a los medicamentos agonistas de GnRH, o cualquiera de los principios del implante de SUPPRELIN® LA, o si está embarazada o queda embarazada. SUPPRELIN® LA puede provocar defectos congénitos o pérdida del embarazo. Si su hija se embaraza, llame a su médico.
- Durante la primera semana de tratamiento, SUPPRELIN® LA puede provocar un aumento de algunas hormonas. Durante este período, podrá notar más signos de pubertad en su hijo, incluso un ligero sangrado vaginal y aumento de las mamas en las niñas. A las 4 semanas de tratamiento, usted debería ver señales de detención de la pubertad en su hijo.
- En algunas personas, el implante de SUPPRELIN® LA colocado en el brazo atraviesa la piel (extrusión). **Llame al médico de su hijo de inmediato si el implante de SUPPRELIN® LA atraviesa la piel.**
- Algunas personas que toman agonistas de la GnRH como SUPPRELIN® LA sufrieron nuevos problemas mentales (psiquiátricos) o el empeoramiento de estos problemas e incluso depresión. Los problemas mentales (psiquiátricos) pueden incluir síntomas emocionales como llanto, irritabilidad, agitación (impaciencia), ira, y actitudes agresivas. **Antes de recibir SUPPRELIN® LA, infórmele al médico si su hijo tiene antecedentes de problemas mentales. Llame al médico de su hijo de inmediato si este tiene algún síntoma o problema mental reciente o que empeora mientras está bajo tratamiento con SUPPRELIN® LA.**
- Algunas personas que toman agonistas de la GnRH como SUPPRELIN® LA tuvieron convulsiones. El riesgo de sufrir convulsiones es más alto en las personas con antecedentes de convulsiones, epilepsia, problemas o tumores en el cerebro o los vasos cerebrales (cerebrovasculares), o en personas que están tomando medicamentos que se han relacionado con convulsiones como el bupropión o los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (SSRIs). También tuvieron convulsiones personas que no habían tenido ninguno de estos problemas. **Antes de que su hijo reciba SUPPRELIN® LA, infórmele al médico si su hijo tiene antecedentes de estos problemas, y los medicamentos que toma. Llame al médico de su hijo de inmediato si este sufre una convulsión mientras está bajo tratamiento con SUPPRELIN® LA.**
- El médico de su hijo debe llevar a cabo pruebas para asegurarse de que este tenga CPP antes del tratamiento con SUPPRELIN® LA. SUPPRELIN® LA dura 12 meses. Un implante suministra el medicamento durante 12 meses. Después de los 12 meses, se debe retirar SUPPRELIN® LA. Es posible que el médico inserte un nuevo SUPPRELIN® LA en ese momento para continuar con el tratamiento.
- SUPPRELIN® LA se coloca subcutáneamente en la cara interior de la parte superior del brazo. El médico anestesiará el brazo de su hijo, hará una pequeña incisión, y luego colocará SUPPRELIN® LA de forma subcutánea. La incisión podrá ser cerrada con puntos o tiras quirúrgicas y cubierta por un vendaje de presión.
- Su hijo debe mantener el brazo limpio y seco y no deberá nadar o bañarse durante las 24 horas posteriores a recibir el implante SUPPRELIN® LA. Se puede retirar el vendaje después de 24 horas. No retire las tiras quirúrgicas. Caerán solas en unos pocos días. Su hijo debe evitar durante 7 días los juegos o ejercicios bruscos que impliquen el uso del brazo implantado. Usted y su hijo deben realizar un control de rutina de la zona de la inserción hasta que la incisión haya cicatrizado. Una vez que la incisión haya cicatrizado, su hijo puede retomar las actividades habituales. El médico le dará las instrucciones completas.
- Asista a todas las visitas médicas programadas. El médico de su hijo realizará exámenes y análisis de sangre periódicos en busca de señales de pubertad. A veces, el médico tendrá que realizar pruebas especiales, como una ecografía o una resonancia magnética, si es difícil hallar el implante de SUPPRELIN® LA bajo la piel de su hijo.
- Los efectos secundarios más comunes de SUPPRELIN® LA son las reacciones cutáneas en la zona de la inserción del implante. Estas reacciones pueden incluir dolor, enrojecimiento, formación de hematomas, inflamación, e hinchazón alrededor o en la zona del implante. Llame al médico de su hijo si este presenta hemorragia, enrojecimiento, o dolor intenso en la zona de inserción del implante.

Se recomienda informar a la FDA sobre los efectos secundarios negativos de los medicamentos recetados. Visite [MedWatch](#) o llame al 1-800-FDA-1088.

Haga [clic aquí](#) para obtener la Información para Prescripción completa, incluida la Guía del Medicamento.

SUPPRELIN® LA
(histrelin acetate) subcutaneous implant

 **endo**
pharmaceuticals
an endo international company

Solo con receta médica

SUPPRELIN® es una marca registrada de Endo International plc o uno de sus afiliados.
© 2021 Endo Pharmaceuticals Inc. Todos los derechos reservados. Malvern, PA 19355
SP-05576/Mayo de 2021 [www.supprelinla.com](#) 1-800-462-ENDO (3636)